Oculoheel®

DIN-HM 80003136

Composition: 1 tablet contains: **medicinal ingredients:** Staphisagria D4 45 mg; Apis mellifica D4 30 mg; Spigelia anthelmia D6 60 mg; Natrium chloratum D6 30 mg; Aethiops mineralis D8 15 mg, Hepar sulfuris calcareum D12 60 mg; Rhus toxicodendron D12 60 mg. Source: www.heel.ca. **Non-medicinal ingredients:** magnesium stearate, lactose monohydrate.

Heel Canada Inc.
Montreal, Canada H1J 2Z4
1-888-879-4335
www.heel.ca

Indications: homeopathic preparation to help treat conjunctivitis, blepharitis, dacryocystitis (particularly chronic forms).

Contraindications: none known.

Side effects: in very rare cases, gastrointestinal complaints or skin reactions can occur even several days after use.

Interactions with other medication: none known.

Cautions and warnings:
- Contains lactose, caution is advised if you suffer from lactose intolerance.
- If symptoms persist or worsen, consult a health care practitioner.
- Doctor's supervision is necessary before administering to babies (0-12 months).
- Keep out of the reach of children.
- Do not use if safety seal is broken.

Recommended storage conditions: protect from heat and humidity. Close container immediately after use.

Directions: adults, 12 years and older, in general, 1 tablet 3 times daily. In acute cases, 1 tablet every ½ to 1 hour, up to 12 times a day. Children (6 to 11 years), in general, 1 tablet 2 times daily. In acute cases, 1 tablet every 1 to 2 hours, up to 8 times a day. Young children (1 to 5 years), in general, ½ tablet 3 times daily. In acute cases, 1 tablet every 1 to 2 hours, up to 6 times a day. Otherwise, use as directed by a homeopathic practitioner or physician. Allow to dissolve slowly in the mouth. Dissolve tablet in a teaspoon of water before administering to a young child.

Recommended duration of use: none.

Presentation: packs containing 50 tablets.

Prospectus d'emballage

Oculoheel MD

DIN-HM 80003136

Composition : 1 comprimé contient : **ingrédients médicinaux :** Staphisagria D4 45 mg; Apis mellifica D4 30 mg; Spigelia anthelmia D6 60 mg; Natrium chloratum D6 30 mg; Aethiops mineralis D8 15 mg, Hepar sulfuris calcareum D12 60 mg; Rhus toxicodendron D12 60 mg. Source: www.heel.ca. **Ingrédients non médicinaux :** stéarate de magnésium, monohydrate de lactose.

Heel Canada Inc.
Montréal, Canada H1J 2Z4
1-888-879-4335
www.heel.ca

Indications : préparation homéopathique qui aide au traitement de la conjonctivite, la blépharite, la dacryocystite (en particulier les formes chroniques).

Contre-indications : aucun répertorié.

Effets secondaires : dans certains cas isolés des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent survenir même quelques jours après l'absorption du produit.

Interactions avec d'autres médicaments : aucune répertoriée.

Précautions et mises en garde :
- Contient du lactose, soyez prudent si vous souffrez d'une intolérance au lactose.
- Si vos symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé.
- Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0-12 mois).
- Garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.

Conditions d'entreposage recommandées : protéger de la chaleur et de l'humidité. Fermer le contenant immédiatement après usage.

Mode d'emploi : adultes, 12 ans et plus, en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 - 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1- 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour. Autrement, utiliser selon l'avis d'un praticien d'homéopathie ou d'un médecin. Laisser dissoudre lentement dans la bouche. Dissoudre le comprimé dans une cuillérée à thé d'eau avant d'administrer à un jeune enfant.

Durée d'utilisation recommandée : aucune.

Présentation : emballages de 50 comprimés.

-Heel